

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?

- Przez 5 do 7 dni będziesz mieć sznurek do szwów biegnący od urządzenia iTIND do penisa. Szew zostanie przyklejony do trzonu prącia. **NIE PRZECINAJ ANI NIE USZKADZAJ SZNURKA DO SZWÓW.** Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy urządzenie zostanie usunięte.
- Krew w moczu, małe skrzepy i pieczenie przy oddawaniu moczu są normalne. Objawy te mogą wystąpić do tygodnia i stopniowo ulegają poprawie.
- Urządzenie wytwarza ciśnienie w obszarze, w którym pęcherz styka się z prostatą, więc zwiększona pilność i częstotliwość oddawania moczu jest również normalna. Ciśnienie ustępuje w ciągu 2 do 3 dni.

INSTRUKCJE ĆWICZEŃ

- Znieczulenie trwa **24 godziny**. W tym czasie nie wolno prowadzić pojazdów/obsługiwać ciężkich maszyn.
- Proszę **ODPOCZAĆ** i zrelaksować się po operacji. Znieczulenie może powodować zawroty głowy i zawroty głowy.
- Odpoczynek lub leżenie na krześle pomoże złagodzić dyskomfort i odciążyc urządzenie.
- Prysunic można wziąć dzień po zabiegu. Należy uważać, aby taśma na wale nie była zbyt mokra lub przemoczona. Zakaz zanurzania w wannach, basenach lub wannach z hydromasażem.
- **NIE** wykonuj forsownej aktywności, gdy urządzenie jest na miejscu, w tym podnoszenia ciężarów, jazdy na rowerze, biegania lub czynności wymagających siedzenia na kosiarce lub pracy ze sprzętem wibracyjnym.
- **ZAKAZ** aktywności seksualnej, gdy urządzenie jest na swoim miejscu.
- Możesz wrócić do normalnych czynności 1 do 2 dni PO wyjęciu urządzenia.

INSTRUKCJE DIETETYCZNE

- Zjedz lekki posiłek po operacji, ponieważ znieczulenie może wywołać mdłości. Nic tłustego ani ostrego.
- Wróć do normalnej diety, jeśli jest tolerowana.
- Zwiększ spożycie płynów i nawodnienie (najlepiej wodę) w ciągu następnego tygodnia. Pomoże to szybciej oczyścić mocz i zapobiegnie powstawaniu zakrzepów krwi.

LEKI

- Weź Tylenol (500 mg co 6 godzin) z ibuprofenem (Motrin, Advil itp.) 600 mg co 6 godzin) w razie potrzeby. Bezpiecznie jest przyjmować te leki razem lub naprzemiennie co 3 godziny.
- Jeśli przepisano Ci lek odurzający na silniejszy ból, należy przyjmować go tylko w razie potrzeby i nie prowadzić pojazdów podczas przyjmowania, ponieważ może to spowodować dezorientację,

Udaj się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli odczuwasz ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub inne nagłe oznaki lub objawy.



SURGERY CENTER

Phone: (224) 612-7000

ITIND PROCEDURE DISCHARGE INSTRUCTIONS

senność i zaparcia. W razie potrzeby dostępne są dostępne dostępne bez recepty środki zmiękczejące stolec.

- Jeśli przepisano Ci antybiotyk, przyjmuj go zgodnie z zaleceniami do końca.

NATYCHMIAST SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI WYSTĄPIĄ NASTĘPUJĄCE OBJAWY:

1. Gorączka większa niż 100,6F, silne dreszcze, utrzymujące się nudności lub wymioty
2. Silny ból, który nie ustępuje po lekach przeciwbólowych
3. Zwiększenie ilości krwi w moczu lub bardzo duże skrzepy krwi
4. Niemożność oddawania moczu

KOLEJNE CZYNNOŚCI

- Zadzwoń do gabinetu lekarskiego, aby umówić się na wizytę kontrolną w celu usunięcia urządzenia iTIND (jeśli nie zostało to jeszcze zaplanowane).

***Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące operacji (nawet po godzinach pracy lub w weekend), ZADZWOŃ DO 24-GODZINNEJ PIEŁĘGNIARKI DYŻURNEJ pod numer 224-612-7000.**

Udaj się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli odczuwasz ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub inne nagłe oznaki lub objawy.